

Análisis Matemático I

Clase 15: Integral Definida: Teorema Fundamental del Cálculo. Área entre curvas.


Pablo D. Ochoa

**Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo.**

Mayo, 2025


Extensión de la Integral definida a funciones con valores reales: sumas de Riemann

La idea de Sumas de Riemann puede aplicarse para aproximar regiones más generales:





Extensión de la Integral definida a funciones con valores reales: Sumas de Riemann

Al aumentar el número de puntos de la partición, se espera una mejor aproximación a la región considerada



Extensión de la Integral definida a funciones con valores reales: Sumas de Riemann

Al aumentar el número de puntos de la partición, se espera una mejor aproximación a la región considerada



Extensión de la Integral definida a funciones con valores reales: Sumas de Riemann

Comentarios importantes: sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, entonces

- las sumas de Riemann asociadas a f pueden definirse como antes, pero si la función toma valores negativos, las sumas de Riemann ya no pueden considerarse como sumas de áreas de rectángulos pues algunos de sus términos podrían ser negativos. (Ver figuras de las diapositivas anteriores)
- La integral:

$$\int_a^b f(x)dx$$

puede definirse exactamente como antes, solo que ahora su valor no se puede interpretar como área de una región.

Propiedades de la integral definida

Propiedades

Sean f y g funciones integrables en $[a, b]$, y sea $k \in \mathbb{R}$. Entonces:

- $\int_a^a f(x)dx = 0$, $\int_a^b 1dx = b - a$.
- $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$.
- $\int_a^b (f(x) - g(x))dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$.
- $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$.
- Si $c \in [a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Teorema del Valor Medio para integrales

Teorema

Sea f una función continua en $[a, b]$. Entonces, existe $c \in [a, b]$ tal que:


$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$

Sin demostración.

Observación: la conclusión del teorema también se puede escribir como:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a).$$

Interpretación geométrica para funciones no negativas:



Así, el Teorema del valor medio para integrales afirma que el área del rectángulo gris $f(c)(b - a)$ es igual al área de la región comprendida por el gráfico de f y el intervalo $[a, b]$:

$$f(c)(b - a) = \int_a^b f(x)dx.$$

Este teorema se utilizará en la demostración del Teorema fundamental del Cálculo.

Teorema fundamental del cálculo

Teorema Fundamental del cálculo: Primera Parte

Sea f una función continua en $[a, b]$. Sea:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b].$$


Entonces:

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in [a, b]$.

Observación: F es una antiderivada de f . El teorema permite construir antiderivadas o primitivas de funciones continuas a través de la integración. La demostración será dada al finalizar el semestre.

Interpretación de la función F cuando $f \geq 0$.



Teorema fundamental del cálculo

Teorema fundamental del cálculo segunda parte

Sea f una función continua en $[a, b]$, y sea F una antiderivada de f en $[a, b]$. Entonces:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

Ejemplos. Calcule:

- $\int_0^\pi \cos(x)dx = \operatorname{sen}(\pi) - \operatorname{sen}(0) = 0$
- $\int_0^2 (x^3 - x)dx = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{4}16 - \frac{1}{2}4 - 0 = 2.$

Demostración del Teorema fundamental del cálculo: segunda parte

Demostración. Sea F una antiderivada de f en $[a, b]$. La parte 1 del *teorema fundamental del cálculo*, nos dice que la función:

$$G(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

es una antiderivada de f en $[a, b]$. Así, F y G son antiderivadas de f , y entonces por la segunda consecuencia del TVM, existe una constante C tal que:

$$F(x) - G(x) = C$$

para toda $x \in [a, b]$. Por lo que $F(x) = G(x) + C$. Luego:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= [G(b) + C] - [G(a) + C] \\ &= G(b) - G(a) \\ &= \int_a^b f(t) \, dt - \int_a^a f(t) \, dt = \int_a^b f(t) \, dt - 0 = \int_a^b f(t) \, dt \end{aligned}$$

Esto termina la demostración.


Cálculo de áreas

Recordar:

Definición

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Entonces el área de la región comprendida entre el gráfico de f , las rectas $x = a$, $x = b$ y el eje x se define como:

$$\int_a^b f(x)dx \text{ (siempre que la integral exista).}$$



Ejemplo 1: supongamos que queremos calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de $f(x) = \operatorname{sen}(x)$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = \pi/2$.


Ejemplo 1: supongamos que queremos calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de $f(x) = \sin(x)$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = \pi/2$.

Solución: Observar que $\sin(x) \geq 0$ para todo $x \in [0, \pi/2]$. Entonces:

$$\text{Área} = \int_0^{\pi/2} \sin(x) dx = -\cos(x) \Big|_0^{\pi/2} = -\cos(\pi/2) - (-\cos(0)) = 1.$$

Cálculo de áreas de funciones arbitrarias

Ejemplo 2: supongamos que ahora queremos calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de $f(x) = \operatorname{sen}(x)$, el eje x y las rectas $x = 0$ y $x = 2\pi$.



En este caso, la función asume valores positivos y negativos. Por ende, no podemos interpretar la integral de f como el área buscada.

Cálculo de área para una función arbitraria

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en $[a, b]$. Para determinar el área comprendida entre el gráfico de f , las rectas $x = a$ y $x = b$ y el eje x , procedemos como sigue:

- Determinamos las intersecciones del gráfico de f con el eje x en el intervalo $[a, b]$.
- Subdividimos $[a, b]$ usando los puntos hallados en el inciso anterior.
- Integraremos f sobre cada sub-intervalo.
- Sumamos los valores absolutos de las integrales calculadas en el apartado anterior.

Solución del ejemplo 2: Observar que $y = \operatorname{sen}(x)$ corta al eje x en $x = 0$, $x = \pi$ y $x = 2\pi$ en el intervalo de integración $[0, 2\pi]$. Luego, utilizando el procedimiento anterior, obtenemos:

$$\text{Área} = \left| \int_0^{\pi} \operatorname{sen}(x) dx \right| + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \operatorname{sen}(x) dx \right| = 4.$$

Ejemplo: determine el área de la región entre el eje x y la gráfica de

$$f(x) = x^3 - x^2 - 2x$$

en el intervalo $[-1, 2]$.