

Análisis Matemático I

Clase 18: Aplicaciones de la integral al cálculo de longitudes. Funciones inversas. Funciones trascendentes.


Pablo D. Ochoa

**Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Cuyo.**

Mayo, 2025

Longitud de una curva

Problema: determine la longitud de la curva dada por una función $y = f(x)$ con derivada continua en el intervalo $[a, b]$.



Longitud de curva

Sea $y = f(x)$ una función tal que f' es continua en $[a, b]$. Entonces la longitud de la curva $y = f(x)$ desde el punto $(a, f(a))$ al punto $(b, f(b))$ es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Longitud de curva

Sea $y = f(x)$ una función tal que f' es continua en $[a, b]$. Entonces la longitud de la curva $y = f(x)$ desde el punto $(a, f(a))$ al punto $(b, f(b))$ es:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

La deducción de esta expresión se hará al final del cuatrimestre.

Ejemplos:

- Determine la longitud de la curva $y = mx + d$, para $x \in [a, b]$. Interpretar el resultado.
- Encuentre la longitud de

$$y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}, \quad x \in [1, 4].$$

Longitud de curva para $x = g(y)$

Longitud de curva

Sea $x = g(y)$ una función tal que g' es continua en $[c, d]$. Entonces la longitud de la curva $x = g(y)$ desde el punto $(c, g(c))$ al punto $(d, g(d))$ es:

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

Una de las ventajas de la expresión anterior, es que a veces la curva $y = f(x)$ puede no verificar las condiciones de continuidad de f' pero al despejar x y obtener $x = g(y)$, se tiene que g sí verifica las condiciones para calcular la longitud de curva en términos de y .

Ejemplo: determine la longitud de $y = (x/2)^{2/3}$, $x \in [0, 2]$.

Funciones inversas

Noción de función inversa

Para poder definir la función inversa de f , necesitamos evitar que la función f asigne el mismo valor a dos elementos distintos del dominio. Así, introduciremos las funciones inyectivas:

Definición de función inyectiva


Una función $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva en D si:

$$f(x) \neq f(y)$$

siempre que $x \in D$, $y \in D$, y además $x \neq y$.


Prueba de la recta horizontal para funciones inyectivas

Observar la gráfica de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$. Es una función inyectiva.



Toda recta horizontal corta en a lo sumo un punto a la gráfica de una función inyectiva.


Prueba de la recta horizontal para funciones inyectivas



Existe una recta horizontal que corta a la gráfica en dos puntos. Luego, $y = x^2$ (con dominio \mathbb{R}) no es inyectiva. Sin embargo, al modificar el dominio podemos construir una función inyectiva.

Prueba de la recta horizontal para funciones inyectivas

La función $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, \infty)$, $f(x) = x^2$ es inyectiva:



Noción de función inversa

A continuación, introduciremos la noción de función inversa:

Definición de función inversa

Sea $f : D \rightarrow R$ una función inyectiva en D , donde R es la imagen o rango de f . La función inversa $f^{-1} : R \rightarrow D$ se define por:

$$f^{-1}(y) = x \text{ si y solo si } f(x) = y$$

para todo $y \in R$.

Observar que:

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{y} \quad f(f^{-1}(x)) = x.$$

Ejemplo: determine la función inversa de $y = \frac{1}{2}x + 1$, y de $y = x^2$, $x \geq 0$.

Ejemplo: determinaremos la función inversa de $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. A partir de la gráfica de f , sabemos que es inyectiva y que el rango de la función es $[0, \infty)$. La función inversa $f^{-1} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ y para calcular $f^{-1}(x)$ procedemos como sigue:

- primero despejamos x en la expresión de $f(x)$:

$$y = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y}.$$

- dado que generalmente expresamos a las funciones con variable independiente x , intercambiamos los símbolos de x e y en la ecuación anterior:


$$y = \sqrt{x}.$$

- Así:


$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}.$$

Veremos gráficamente cómo determinar la función inversa y cómo se relacionan las gráficas de f y f^{-1} :


1-primero hacemos el gráfico de f y trazamos la recta $y = x$ con un trazo tenue:




2-tomamos un punto de la gráfica de f y trazamos un segmento perpendicular a la recta $y = x$ que tenga como un extremo el punto elegido y el otro extremo en la recta $y = x$:




3- prolongamos el segmento del ítem anterior en dirección perpendicular a la recta $y = x$ hasta cubrir una longitud igual al segmento original:



4-realizamos el procedimiento anterior varias veces, resaltando (en este caso con rojo) los extremos de los segmentos construidos:



5-La gráfica de f^{-1} es la curva que conecta a todos los puntos construidos (puntos rojos).



Observar que la gráfica de la función inversa es simétrica con respecto la recta $y = x$.

Derivación de funciones inversas

Recordar que:

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Si f y f^{-1} son derivables, entonces la regla de la cadena implica:

$$(f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) = 1.$$

Luego si $y = f(x)$ y $f'(x) \neq 0$ entonces:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Recordando que $x = f^{-1}(y)$ obtenemos la fórmula:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

Ejemplos: determinar la derivada de la función inversa de $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = x^2$.

Ejemplos: determinar la derivada de la función inversa de $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, $f(x) = x^2$.

Solución: observar primero que $f'(x) = 2x \neq 0$ para $x \in (0, \infty)$. Recordar que $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$. Luego:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Observación: la función inversa y su derivada suelen denotarse usando a x como variable independiente. Así, la fórmula anterior para la derivada se puede escribir:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

En la clase siguiente utilizaremos la fórmula anterior para obtener la derivada de varias funciones inversas (funciones trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas, etc.)


Estudio de funciones trascendentales

Excepto por las funciones trigonométricas, hasta ahora hemos analizado **funciones algebraicas**, es decir, funciones que se obtienen por suma, resta, división, multiplicación o extracción de raíces de polinomios.

Ahora comenzaremos con el estudio de funciones no algebraicas o también llamadas **trascendentes**.

Ejemplos de funciones no algebraicas son las funciones: trigonométricas, logarítmicas, exponenciales y otras funciones como las hiperbólicas.

La siguiente figura ilustra una función trascendente (función coseno hiperbólico):




Logaritmos

Definición del Logaritmo natural

Definimos la función logaritmo natural $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad \text{para } x > 0.$$

Observar que para x mayor a 1 se tiene:



Logaritmos

Además:

$$\ln(1) = \int_1^1 \frac{1}{t} dt = 0,$$

si $x \in (0, 1)$ entonces:

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt = - \int_x^1 \frac{1}{t} dt < 0$$

y si $x > 1$:

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt > 0.$$


Además, por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}, \quad (x > 0)$$

por ende \ln es una función creciente pero es cóncava hacia abajo pues:

$$\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Logaritmos



Logaritmos

El logaritmo puede extenderse a valores de x negativos poniendo valores absolutos:

$$\ln(|x|) = \int_1^{|x|} \frac{1}{t} dt.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\ln'(|x|) = \frac{1}{x}, \text{ para cada } x \neq 0.$$

Así:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + C.$$

Definición: el número e se define como:

$$\ln(e) = 1.$$

Ejemplos: calcule $\int \tan(x)dx$, $\int \sec(x)dx$, $\int \cotan(x)dx$, $\int \cosec(x)dx$.

Vamos a calcular:

$$\int \tan(x) dx.$$

Primero escribimos:

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx$$

y hacemos la sustitución:

$$u = \cos(x), \ du = -\sin(x) dx.$$

Reemplazando:

$$\int \tan(x) dx = - \int \frac{1}{u} du = -\ln(|u|) + C = -\ln(|\cos(x)|) + C.$$